

Tabela de Tamanhos Mínimos de Captura

(Portaria nº 27/2001, de 15 de janeiro, com as alterações dadas pelas Portarias; nº 402/2002, de 18 de abril, nº 1266/2004, de 1 de outubro, nº 82/2011, de 22 de fevereiro, nº 119/2014 de 3 de junho, nº 170/2014, de 22 de agosto, Regulamento (CE) 302/2009 de 6 de abril, Portaria nº 247/2016, de 14 de setembro e Portaria nº 56/2020, de 3 de março e Regulamento (UE) 2019/1241 de 20 de junho)

| PEIXES | |
|---|---------------------------|
| Nome vulgar da espécie ou género (Nome científico) | Tamanho mínimo de captura |
| Areeiros (todas as espécies do género <i>Lepidorhombus</i>) | 20 cm |
| Arenque (<i>Clupea harengus</i>) | 20 cm |
| Atum-patudo (<i>Thunnus obesus</i>) | 10 kg |
| Atum-rabilho (<i>Thunnus thynnus</i>) | 30 Kg ou 115 cm (a) |
| Azevia, Malacueco (<i>Microchirus azevia</i>) | 18 cm |
| Badejo (<i>Merlangius merlangus</i>) | 27 cm |
| Baila, Robalo-baila (<i>Dicentrarchus punctatus</i>) | 20 cm |
| Besugo (<i>Pagellus acarne</i>) | 18 cm |
| Bica (<i>Pagellus erythrinus</i>) | 15 cm |
| Biqueirão (<i>Engraulis encrasicolus</i>) | 12 cm |
| Boga, Boga-do-mar (<i>Boops boops</i>) | 15 cm |
| Carapau (<i>Trachurus trachurus</i>) | 15 cm (b) |
| Carapau-negrão (<i>Trachurus picturatus</i>) | 15 cm (b) |
| Choupa (<i>Spondyliosoma cantharus</i>) | 23 cm |
| Congro, Safio (<i>Conger conger</i>) | 58 cm |
| Corvina-legítima (<i>Argyrosomus regius</i>) | 42 cm |
| Dourada (<i>Sparus aurata</i>) | 19 cm |
| Enguia (<i>Anguilla anguilla</i>) | 22 cm |
| Espadarte (<i>Xiphias gladius</i>) | 25 kg ou 125 cm (c) |
| Faneca (<i>Trisopterus luscus</i>) | 17 cm |
| Ferreira (<i>Lithognathus mormyrus</i>) | 15 cm |
| Goraz (<i>Pagellus bogaraveo</i>) | 33 cm |
| Juliana, Paloco (<i>Pollachius pollachius</i>) | 30 cm |
| Lampreia-do-mar (<i>Petromyzon marinus</i>) | 35 cm |
| Língua (<i>Dicologlossa cuneata</i>) | 15 cm |
| Linguados (todas as espécies do género <i>Solea</i>) | 24 cm |
| Pargo-legítimo (<i>Pagrus pagrus</i>) | 20 cm |
| Pescada-branca (<i>Merluccius merluccius</i>) | 27 cm |
| Pregado (<i>Psetta maxima</i>) | 30 cm |
| Raias (todas as espécies dos géneros <i>Raja</i> e <i>Leucoraja</i>) | 52 cm |
| Robalo-legítimo (<i>Dicentrarchus labrax</i>) | 36 cm |
| Rodvalho (<i>Scophthalmus rhombus</i>) | 30 cm |
| Salema (<i>Sarpa salpa</i>) | 18 cm |
| Salmão (<i>Salmo salar</i>) | 55 cm |
| Salmonete-legítimo (<i>Mullus surmuletus</i>) | 18 cm |
| Sarda, Cavala (todas as espécies do género <i>Scomber</i>) | 20 cm |
| Sardinha (<i>Sardina pilchardus</i>) | 11 cm |
| Sargos (todas as espécies do género <i>Diplodus</i>) | 15 cm |
| Sáveis e savelhas (todas as espécies do género <i>Alosa</i>) | 30 cm |
| Solha-legítima, Solha-avessa, (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 27 cm |
| Solha-da-pedra (<i>Platichthys flesus</i>) | 22 cm |
| Tainhas (todas as espécies do género <i>Mugil</i>) | 20 cm |
| Truta-marisca, Truta-comum (<i>Salmo trutta</i>) | 30 cm |

EQUINODERMES

| Nome vulgar da espécie ou género (Nome científico) | Tamanho mínimo de captura |
|--|---------------------------|
| Ouriço-do-mar (<i>Paracentrotus lividus</i>) | 5 cm |

CRUSTÁCEOS

| Nome vulgar da espécie ou género (Nome científico) | Tamanho mínimo de captura |
|--|--------------------------------|
| Camarão-branco-legítimo, Camarão-da-costa, Camarão-de-Espinho (<i>Palaemon serratus</i>) | 6 cm |
| Camarão-de-Quarteira, Gamba-manchada (<i>Melicertus kerathurus</i>) | [3 cm] (d) |
| Camarão-mouro, Camarão-negro, Camarão-do-rio (<i>Crangon crangon</i>) | 5 cm |
| Camarão-vermelho, Camarão-carabineiro (<i>Aristeus antennatus</i>) | 9,4 [2,9] cm (d) |
| Caranguejo-mouro, Caranguejo-verde (<i>Carcinus maenas</i>) | 5 cm |
| Gamba-branca, Gamba-legítima (<i>Parapenaeus longirostris</i>) | 9,4 [2,4] cm (d) |
| Lagostas (todas as espécies do género <i>Palinurus</i>) | [9,5 cm] (d) |
| Lagostim (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 7 [2] cm (d) {caudas - 3,7 cm} |
| Lavagante-europeu (<i>Homarus gammarus</i>) | [8,7 cm] (d) |
| Navalheiras (<i>Necora puber</i> e todas as espécies do género <i>Liocarcinus</i>) | 5 cm |
| Percebe (<i>Pollicipes pollicipes</i>) | 2 cm (e) |
| Santola (<i>Maja squinado</i>) | 12 cm |
| Sapateira (<i>Cancer pagurus</i>) | 13 cm |

MOLUSCOS

| Nome vulgar da espécie ou género (Nome científico) | Tamanho mínimo de captura |
|---|--|
| Amêijoia-boa (<i>Ruditapes decussatus</i>) | 4 cm |
| Amêijoia-branca (<i>Spisula solida</i> e <i>Spisula solidissima</i>) | 2,5 cm |
| Amêijoia-cão (<i>Venerupis aurea</i>) | 2,5 cm |
| Amêijoia-japonesa (<i>Ruditapes philippinarum</i>) | 4 cm |
| Amêijoia-macha (<i>Venerupis corrugata</i>) | 3,8 cm; 3,0 cm (aplicável em águas interiores não marítimas) |
| Berbigão (<i>Cerastoderma edule</i>) | 2,5 cm |
| Burriés (todas as espécies do género <i>Gibulla</i> , <i>Littorina litorea</i> e <i>Monodonta lineata</i>) | 1,2 cm |
| Búzio (<i>Murex trunculus</i>) | 5 cm |
| Buzo (<i>Buccinum undatum</i>) | 4,5 cm |
| Cadelinhas, Conquilhas (todas as espécies do género <i>Donax</i>) | 2,5 cm |
| Canilha, Búzio, Búzio-canilha (<i>Bolinus brandaris</i>) | 6,5 cm |
| Choco-vulgar (<i>Sepia officinalis</i>) | 10 cm |
| Clame-dura, Ameijola (<i>Callista chione</i>) | 6 cm |
| Lambujinha (<i>Scrobicularia plana</i>) | 2,5 cm |
| Lapas (todas as espécies do género <i>Patella</i>) | 2 cm |
| Leques (todas as espécies do género <i>Chlamys</i>) | 4 cm |
| Longueirão (todas as espécies do género <i>Ensis</i>) | 10 cm |
| Longueirão (<i>Pharus legumen</i>) | 6,5 cm |
| Lula-vulgar (<i>Loligo vulgaris</i>) | 10 cm |
| Mexilhões (todas as espécies do género <i>Mytilus</i>) | 5 cm |
| Navalha, Longueirão (<i>Pharus legumen</i>) | 6,5 cm |
| Pé-de-burrinho (<i>Chamelea gallina</i>) | 2,5 cm |
| Pé-de-burro (<i>Venus verrucosa</i>) | 4 cm |
| Polvo-vulgar (<i>Octopus vulgaris</i>) | 0,750 kg |
| Vieira (<i>Pecten maximus</i>) | 10 cm |

- (a) Com exceção de exemplares capturados por navios de pesca com cana (isco) e corrico, sendo neste caso 8Kg ou 75 cm.
- (b) Podem ser desembarcados exemplares com comprimento entre 12 e 14 cm, nos termos da legislação comunitária aplicável. Não aplicável nas águas da subárea dos Açores da zona económica exclusiva (ZEE).
- (c) Os valores correspondem a peso vivo e medidos da mandíbula inferior à furca.
- (d) Os valores dizem respeito ao comprimento total, sendo apresentados entre parênteses os valores que dizem respeito ao comprimento da carapaça ou cefalotórax.
- (e) Pelo menos 75 % do peso deve ser constituído por exemplares com tamanho igual ou superior a 20 mm, não podendo ser transportados, armazenados, expostos, colocados à venda ou vendidos separadamente exemplares de tamanho menor, devendo, a todo o momento, estar garantida, no peso de cada lote, essa percentagem. Sem prejuízo de disposições legais estabelecidas em legislação específica em áreas protegidas.